

うおのめ・たこ・いぼ用薬

コーンソルベント (Corn Solvent)

うおのめは、中央にかたくなった角質の隆起がみられるものです。上から押すと痛みがあります。

たこは、扁平でかたい隆起がみられるものです。押しても痛みはありません。

いぼは通常、ウイルスの表皮感染によっておこる皮膚の部分的変化です。普通にみられるいぼは、半球状で表面がザラザラとしていて、とくに学童や青年の手の甲や指、爪のまわりなどに発生しやすく、尋常性いぼと呼ばれています。

なお、本剤の使用が適当でない部位または症状のものもありますので、「使用上の注意」及び「こんないぼには要注意!!」をよく読んでから使用してください。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位又は症状には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜、やわらかい皮膚面(首の回り等)、顔面等。
- (2) 炎症又は傷のある患部。
- (3) みずいぼ。
- (4) 湿ったいぼ。
- (5) 群生したいぼ、身体に多発したいぼ。
- (6) 外陰部や肛門のまわりにできたいぼ(尖形いぼ)。
- (7) 褐色か黒色の扁平に隆起したいぼ(老人性いぼ)。
- (8) 掻き傷にそって一列にできることがある若年性扁平いぼ。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 乳幼児。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

うおのめ、たこ、いぼ

用法・用量

1日1回、ふたに取り付けた棒の先に薬液をつけ、患部に塗布してください。およそ4日間続けた後、患部を温湯に数分間つけ、取り除きます。なお、上記のようにしても容易に取り除かれない場合は、2～3日を限度として、塗布を続けてください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5) 患部の周りの皮膚につかないよう、よく注意して使用してください。もしついた場合には、すぐにふきとってください。

成分・分量(1mL中)

成 分	分 量	作 用
コロジオン	749.0mg	皮膚に塗るとエーテルが蒸発して薄い膜をつくります。この膜によって主薬を患部に固着させます。
サリチル酸	71.9mg	角質軟化作用があります。

添加物：銅クロコフィル、アセトン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 本剤は揮発性ですので、使用後は必ず密栓し、高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 本剤は引火性ですので、火気に近づけないでください。
- (6) 使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は使用しないでください。

効果的な使い方

1. 1日1回、ふたに取り付けた棒の先に薬液をつけ患部に塗布してください。

※薬剤部分が健康な皮膚に付着すると、その部分も白く軟化し、痛むこともありますので注意して使用してください。なお、入浴後、患部をよく拭いて使用すると一層効果的です。

2. 薬液はすぐに乾いて白い被膜をはり、薬剤が患部に浸透していきます。次に塗布するときは、この被膜をはがしてから塗ってください。

※被膜を取り除くとき、痛む場合は無理に取り除かないで、被膜の上に重ねて塗布してください。

3. 3～4日間塗布を続けた後、患部を温湯に数分間つけ、被膜と白くなった角質部を痛みを感じない程度に取り除きます。皮膚は再生されますので、清潔にしておいてください。患部が完全に取り除けない場合は、さらに薬液の塗布を繰り返し行ってください。特にうおのめはしん(角質柱)を完全に取り除かないと再発しますので繰り返し使用してください。

こんないぼには要注意!!

■医師に相談してください

【尋常性いぼ】

できやすい場所: 学童や青年の手の甲や指、爪のまわり。

でき方: ウイルスの感染で起こる。手のひらにできた場合は、うおのめに似た形になる。



【若天性扁平いぼ】

できやすい場所: 手の甲

でき方: 掻き傷にそって一列にいぼがならぶことがある。

※手の甲にいぼがあれば、顔にいぼがみつかることも多い。



【尖形いぼ】

できやすい場所: 外陰部、肛門の周囲等ただれやすい場所。

でき方: いぼ状に隆起している。表面はにわたりのとさかのように乾いている場合と、湿っている場合がある。



【老人性いぼ】

できやすい場所: 顔、くび、背中、手の甲等

でき方: 褐色か黒色の扁平に隆起したいぼ。角化し、硬い悪性の腫物もあるので、医師に診てもらふこと。



本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間: 月～金(祝日を除く) 9:00～17:00



発売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

製造販売元 株式会社フジミ製薬所 大阪市東成区中本2-9-9